

ステップ名称	前日	手術当日	手術当日	退院		
	1日目	2日目				
		術前	腹腔鏡下	術後		
患者状態	■身体的準備ができています ・治療計画を言える	■身体的準備ができています ・食事制限が守られている ・治療計画を言える	■アレルギーの症状・所見がない	■食事摂取ができる ・嘔気がない ・嘔吐がない		
	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない		■排尿障害の症状・所見がない ・自尿がある		
				■創部に問題がない ・腫脹がない ・出血がない ・発赤がない		
知識・教育・理解	■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない	■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない		■疼痛のコントロールができています ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます		
				■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる		
治療方針	手術 (腹腔鏡下胆嚢摘出術)			腕 ENT 胃異常症食		
治療	入院予約/食事	入院予約 (夕食あり: 24時以降禁食) 術前は絶飲食です 胃異常症食	朝食禁 水分摂取、術前2時間前まで可 術前は絶飲食です 飲食	飲水開始 ・術後3時間後、飲水テストし嘔気・嘔吐なければ 飲水開始		
	手術室予約		腹腔鏡下胆嚢摘出術			
	注射		滴をします	滴を継続します		
			菌薬の点滴をします	後、抗菌薬の点滴をします		
	内服	指示された薬のみ、内服して下さい	指示された薬のみ、内服して下さい		キソプロフェンNa (60mg) フレノンop (50mg) ホルタレン座薬25mg ロナール (500mg) ンヒバ (200mg)	
	インスリン					
	処置		医師により手術部位にマークをします	尿管留置カテーテル挿入あれば 歩行可能時、抜去可 抜去後6時間自尿なければ導尿		
			「リスク評価指示により 要時に弾性ストッキング着用	性ストッキング着用ある場合 歩行確認できたら終了可		
			血栓塞栓症予防	素投与		
	医師指示	休薬確認 尿測不要 モニター不要	チェック 尿病患者のみ 処置をお願いします	ニター管理	ニター管理	
輸血						
検温	検温3検	温3検 O2測定	温3検	温3検 O2測定	温3検	
				電図モニター管理 ベッド上安静の間)		
安静度	フリー			ベッド上安静		
清潔	シャワー浴可	シャワー浴可				
持参薬検査希望	参薬確認			参薬再開の指示を主治医に確認		
検査	採血			液検査があります		
	生理機能					
	放射線		後胸部・腹部レントゲン			
	病理					
患者教育	退院相談依頼					
	退院時教育				正業の再開確認	
服薬指導	薬指導				院時服薬指導	
栄養指導	養指導 (胆嚢摘出後) へ手術後当日帰宅の場合のみ、 術後指導					
リハビリ指導						
看護	清潔ケア	シャワー浴	拭	拭	拭	
	排泄ケア	安静度に準ずる	安静度に準ずる	尿管留置カテーテル管理	尿管留置カテーテル管理	
	患者教育	院・術前オリエンテーション				
	観察項目	痛 節膨満感 心 嘔吐	痛 節膨満感 心 嘔吐	痛 節膨満感 心 嘔吐	痛 節膨満感 心 嘔吐	痛 節膨満感 心 嘔吐
				後観察項目 音 酸素濃度 HR	後観察項目 音 酸素濃度 HR	後観察項目 音 酸素濃度 HR
	経過表					
看護計画						
各種文書	術同意書					
	説明書/同意書 酔同意書					

各種文書	入院診療計画書	 入院診療計画書				
	退院証明書/退院サマリー					 院証明書
その他	 血栓塞栓症リスク評価表					
カルテ記録	カルテ					
退院後診療予約						次回、外来予約確認、予約表お渡し